

EC FERTILIZER
KİREÇLEME MATERYALİ – SÖNMÜŞ KİREÇ SÜSPANSİYONU

KIREXPRESS

NET: 20 lt
(21,6 KG)

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

(w/w)

Toplam Kalsiyum (Ca)	% 25
Toplam Magnezyum (Mg)	% 5
Nötrleştirme Değeri (ND)	20
pH	11-13



LİSANS NO: 2339 TESCİL NO: 2021TK1314



Üretici Firma:
Agri Ciel Enstitü Tarımsal Arge Teknolojileri Gıda Gübre Organik Zirai İlaçlar Üretim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Ostim OSB Mah. Cevat Dünder Cad. Ostim Teknopark Turuncu Bina No:1/1/11 - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 385 00 99 - E-mail: agricielenstitü@gmail.com - www.agriciel.com



EC FERTILIZER
KİREÇLEME MATERYALİ – SÖNMÜŞ KİREÇ SÜSPANSİYONU

KIREXPRESS

NET: 20 lt
(21,6 KG)

GARANTİ EDİLEN İÇERİĞİ

(w/w)

Toplam Kalsiyum (Ca)	% 25
Toplam Magnezyum (Mg)	% 5
Nötrleştirme Değeri (ND)	20
pH	11-13



LİSANS NO: 2339 TESCİL NO: 2021TK1314



Üretici Firma:
Agri Ciel Enstitü Tarımsal Arge Teknolojileri Gıda Gübre Organik Zirai İlaçlar Üretim İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Ostim OSB Mah. Cevat Dünder Cad. Ostim Teknopark Turuncu Bina No:1/1/11 - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0312 385 00 99 - E-mail: agricielenstitü@gmail.com - www.agriciel.com



KULLANIM MİKTALARI

BİTKİ GRUBU

Fındık
Çay
Diğer meyve ağaçları
Pamuk, Mısır, Hububat, ayçiçeği, çeltik
Yonca, Çayır-Mera, Yem bitkileri
Zeytin, incir, Turunçgiller

UYGULAMA ZAMANI, ŞEKLİ ve DOZU

Süspansiyon halindeki sıvı kireç uygulaması Sonbahar ve ilkbahar arasında (Kasım-Mart) taç iz düşümüne 100-250 gr (2 litre su ile) ocak başına verilir.
Çay da sıra üzeri ve arasına 10-25 gr/m ² hesabı ile verilir.
Fındık gibi uygulanır. Sadece asit karakterli topraklarda ve/veya eksikliği durumunda kullanılır.
Ekim öncesi sonbahar toprak işlemeden önce 5-7 kg/da olarak verilir.
Toprak hazırlığında ve her biçimden sonra 500-700 gr/da sulama suyu ile birlikte
Süspansiyon halindeki sıvı kireç uygulaması Sonbahar ve ilkbahar arasında (Kasım-Mart) taç iz düşümüne 100-250 gr (2 litre su ile) ağaç başına verilir.

Bu bilgiler tavsiye niteliğinde olup "Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir."

Firma Beyanı: Kullanmadan önce çalkalayınız. Tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürün kalitesini garanti ederiz. Hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar garanti kapsamı dışındadır.

UYARILAR

- ★ Asla uygun doz oranını aşmayınız. Gerekli yerlerde ve zamanlarda kullanınız.
- ★ Kullanırken bir şey yiyip içmeyiniz. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.
- ★ Gübreleme esnasında eldiven, maske ve koruyucu gözlük kullanınız.
- ★ Çocuklardan, yiyecek içecek ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- ★ Teneffüs edildiği taktirde beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
- ★ Kullanışmış boş ambalajları başka amaçla kullanmayıp imha ediniz.
- ★ Yiyecek, içecek ve yemlerle birlikte depolamayınız.

DEPOLAMA TALİMATLARI

- ★ Ürünü serin kuru ve havadar bir yerde muhafaza ediniz.
- ★ Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- ★ Depolarda sigara içmeyiniz, patlayıcı, yanıcı ve diğer
- ★ Kimyasallardan uzak tutunuz.
- ★ Depolama sıcaklığı +5°C ve +40°C arasında olmalıdır.

LİSANS NO: 2339 TESCİL NO: 2021TK1314

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANIM TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

PARTİ NO:

Karıştırılabilirlik: Toprak asitliğini gidermek amacıyla kullanılır. Herhangi bir ürün ile karıştırılması önerilmez.

KULLANIM MİKTALARI

BİTKİ GRUBU

Fındık
Çay
Diğer meyve ağaçları
Pamuk, Mısır, Hububat, ayçiçeği, çeltik
Yonca, Çayır-Mera, Yem bitkileri
Zeytin, incir, Turunçgiller

UYGULAMA ZAMANI, ŞEKLİ ve DOZU

Süspansiyon halindeki sıvı kireç uygulaması Sonbahar ve ilkbahar arasında (Kasım-Mart) taç iz düşümüne 100-250 gr (2 litre su ile) ocak başına verilir.
Çay da sıra üzeri ve arasına 10-25 gr/m ² hesabı ile verilir.
Fındık gibi uygulanır. Sadece asit karakterli topraklarda ve/veya eksikliği durumunda kullanılır.
Ekim öncesi sonbahar toprak işlemeden önce 5-7 kg/da olarak verilir.
Toprak hazırlığında ve her biçimden sonra 500-700 gr/da sulama suyu ile birlikte
Süspansiyon halindeki sıvı kireç uygulaması Sonbahar ve ilkbahar arasında (Kasım-Mart) taç iz düşümüne 100-250 gr (2 litre su ile) ağaç başına verilir.

Bu bilgiler tavsiye niteliğinde olup "Toprak ve/veya yaprak analizi yaptırılarak kullanılması tavsiye edilir."

Firma Beyanı: Kullanmadan önce çalkalayınız. Tavsiyelere uyularak kullanıldığında ürün kalitesini garanti ederiz. Hatalı kullanım ve karışımlardan dolayı doğabilecek olumsuzluklar garanti kapsamı dışındadır.

UYARILAR

- ★ Asla uygun doz oranını aşmayınız. Gerekli yerlerde ve zamanlarda kullanınız.
- ★ Kullanırken bir şey yiyip içmeyiniz. Göz, yüz ve deri ile temas ettirmeyiniz, temas halinde bol su ile yıkayınız.
- ★ Gübreleme esnasında eldiven, maske ve koruyucu gözlük kullanınız.
- ★ Çocuklardan, yiyecek içecek ve evcil hayvanlardan uzak tutunuz.
- ★ Teneffüs edildiği taktirde beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.
- ★ Kullanışmış boş ambalajları başka amaçla kullanmayıp imha ediniz.
- ★ Yiyecek, içecek ve yemlerle birlikte depolamayınız.

DEPOLAMA TALİMATLARI

- ★ Ürünü serin kuru ve havadar bir yerde muhafaza ediniz.
- ★ Direk güneş ışığına maruz bırakmayınız.
- ★ Depolarda sigara içmeyiniz, patlayıcı, yanıcı ve diğer
- ★ Kimyasallardan uzak tutunuz.
- ★ Depolama sıcaklığı +5°C ve +40°C arasında olmalıdır.

LİSANS NO: 2339 TESCİL NO: 2021TK1314

ÜRETİM TARİHİ:

SON KULLANIM TARİHİ: Üretim tarihinden itibaren 3 (üç) yıldır.

PARTİ NO:

Karıştırılabilirlik: Toprak asitliğini gidermek amacıyla kullanılır. Herhangi bir ürün ile karıştırılması önerilmez.

EC FERTILIZER
KİREÇLEME MATERYALİ – SÖNMÜŞ KİREÇ SÜSPANSİYONU



KIREXPRESS

NET: 20 lt
(21,6 KG)



LİSANS NO: 2339 TESCİL NO: 2021TK1314



EC FERTILIZER
KİREÇLEME MATERYALİ – SÖNMÜŞ KİREÇ SÜSPANSİYONU



KIREXPRESS

NET: 20 lt
(21,6 KG)



LİSANS NO: 2339 TESCİL NO: 2021TK1314

